



Současná situace po prvním ošetření SMART KWS cukrovky

- První aplikace herbicidu CONVISO® ONE při dodržení všech doporučení a použití smáčedla MERO® i přes obtížné podmínky v naprosté většině případů zvládla bez problémů většinu plevelů v cukrovce, včetně obtížně hubitelných.
- Příznaky odumírání plevelů po první aplikaci se projevují zvláště za sucha pomaleji, než u klasických herbicidů, plevele ale nerostou a zcela odumírají po 2-3 týdnech (pozor - po pěti dnech od aplikace nemusí být ještě vidět vůbec žádné příznaky).
- Půdní působení herbicidu může být za sucha slabší, po dešti se vlhkostí opět zesiluje.
- V některých lokalitách může být již nyní čas na druhé ošetření, **vždy se ale řiďte velikostí nově vzešlých plevelů!**

Jak správně načasovat 2. aplikaci?

- Minimální odstup od první aplikace musí být 10 dnů.
- Termín aplikace se vždy řídí **růstovou fází plevelů**, především merlíku bílého.
- Ideální je opět načasování aplikace zhruba do **fáze 4 pravých listů** merlíku bílého (velikost cca 4 cm) nebo jiných nově vzešlých plevelů. Plevlele musí mít pro aplikaci **dostatečnou listovou plochu** pro zachycení postřikové kapaliny.
- Nezáleží na růstové fázi cukrovky**, která je k herbicidu tolerantní.
- Vždy používejte **dávku herbicidu CONVISO® ONE 0,5l/ha spolu s 1 l/ha smáčedla Mero®**.
- Za dlouhotrvajícího sucha se osvědčuje aplikace v ranních hodinách.
- Pokud další vlna plevelů nevzchází**, je možné počkat s ošetřením na dobu, kdy plevele vzejdou, odstup od první aplikace může být i 20 až 30 dní.
- Druhé ošetření je **však NEZBYTNÉ provést VŽDY**, tedy i v případě že další vlna plevelů nepřichází! (zabráníme tak případnému pozdnímu zaplevelení a vzházení dalších plevelných řep z půdní zásoby).
- Druhé ošetření je nutné provést nejpozději **před zakrytím meziřádků** listy řepy, poté by již nebylo účinné (herbicid by nezasáhl plevele a půdu)!



Zásady pro aplikaci herbicidu

CONVISO® ONE

Vždy aplikujte **0,5 l herbicidu CONVISO® ONE** s plnou dávkou **smáčedla Mero® (1 l/ha)** při doporučené dávce vody 200 - 300 l/ha.

Před použitím nezapomeňte herbicid v kanystru řádně promíchat!

Porost musí být při ošetření suchý, neošetřujte bezprostředně po dešti. Odstup srážek od aplikace by měl být alespoň 1,5 hodiny po zaschnutí postřikové kapaliny na plevelech.

Optimální teplota vzduchu je 10 – 25 °C.


Po intenzivních srážkách je vhodné ošetření o 2 až 3 dny odložit.

Reziduální působení je závislé na vlhkosti půdy a trvá 2 – 3 týdny po aplikaci.

Herbicid CONVISO® ONE nikdy nepoužívejte na klasické odrůdy cukrovky!



Příliš brzo: stadia merlíku bílého nevhodná pro aplikaci herbicidu CONVISO® ONE (děložní listy nebo velmi malé rostliny s malou listovou plochou).



Správná velikost merlíku bílého pro aplikaci herbicidu CONVISO® ONE (4 pravé listy, velikost cca 4 cm).



CONVISO® SMART +

Aktuální situace na mnoha polích: plevele odumírají po prvním ošetření herbicidem CONVISO® ONE (červeně označené) a zároveň vzhází a roste nová vlna plevelů (oranžově označené). Při dosažení správné velikosti plevelů (cca 4 cm, 4 listy) je třeba přistoupit k druhé aplikaci herbicidu.

