

Jaké je správné dávkování?

Při každém ošetření aplikujte **0,5 l herbicidu CONVISO® ONE** s plnou dávkou olejového **smáčedla Mero®**. 1 l/ha olejového smáčedla* v každé aplikaci zvyšuje účinnost za sucha a chladna, zlepšuje přilnavost, pokrývnost a příjem herbicidu plevelem a eliminuje vliv voskové vrstvy na listech. Smáčedlo navíc zvyšuje odolnost herbicidu vůči dešťovým srážkám. Doporučená dávka vody je 200 – 300 l/ha. Před použitím nezapomeňte herbicid v kanystru nebo láhvi řádně promíchat!

*jako náhradu za MERO® lze použít jiné olejové smáčedlo, např. Istroekol, Tipo, Toil



Herbicid

Smáčedlo

Jak správně načasovat aplikaci?

1. Plevel musí mít pro aplikaci **dostatečnou listovou plochu** pro zachycení postřikové kapaliny.
2. Ideální je načasování aplikace zhruba **do fáze 4 pravých listů** merlíku bílého (velikost cca 4 cm).
3. Vodítkem může být T2 aplikace v klasické technologii pěstování cukrovky - zhruba ve stejné době je třeba aplikovat první postřik herbicidem CONVISO® ONE ve SMART KWS odrůdách.
4. **Nezáleží na růstové fázi cukrovky**, která je k herbicidu tolerantní (nerovnoměrně vzešlý porost cukrovky není překážkou pro aplikaci).
5. Za déletrvajícího sucha se osvědčuje aplikace v ranních hodinách.
6. Druhá aplikace CONVISO® ONE následuje opět na plevele ve fázi čtyř pravých listů, nejdříve však 10 dnů po první aplikaci a nejpozději před zaklopením řádků cukrovky.



! Příliš brzo: stadia merlíku bílého ne zcela vhodná pro aplikaci herbicidu CONVISO® ONE – děložní listy nebo velmi malé rostliny s malou listovou plochou.

Správná velikost merlíku bílého pro aplikaci herbicidu CONVISO® ONE - 4 pravé listy, velikost cca 4 cm.

Schéma použití herbicidu CONVISO® ONE

Dělená aplikace s odstupem minimálně 10 dnů, **do maximální dávky 1 l/ha.**

100–300 l/ha vody

Cukrovka
Plevel

1. aplikace

0,5 l/ha
+ 0,5–1 l/ha Mero®

BBCH 10–14
BBCH 12–14

Interval mezi aplikacemi
minimálně 10 dní

2. aplikace

0,5 l/ha
+ 0,5–1 l/ha Mero®

BBCH 12–18
BBCH 12–14

